

อาชมา บารูวาล: ความรู้ ทัศนคติ และการป้องกันโรคกระบังลมหย่อนในสตรีสมรสที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ใน 8 หมู่บ้าน เมืองชุกีท ประเทศเนปาล (KNOWLEDGE, ATTITUDE, PREVENTIVE MEASURES AMONGST MARRIED WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE TOWARDS UTERINE PROLAPSE IN THE 8 VDCs OF SURKHET DISTRICT, NEPAL) อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนา สำโรงทอง ,104 หน้า

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความชุก ความรู้ ทัศนคติ และการป้องกันโรคกระบังลมหย่อนในสตรีสมรสที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ใน 8 หมู่บ้าน ในตำบลชุกีท ประเทศเนปาล อันเป็นการศึกษาแบบตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างจำนวน 267 คน โดยการสุ่มอย่างเป็นระบบ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไคว์สแคว และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ ที่ p value 0.05 นอกจากนี้ได้จัดการสนทนากลุ่มในกลุ่มผู้หญิงที่เป็นและไม่ใช่กระบังลมหย่อนเพื่อทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมการป้องกัน

ผลการศึกษาพบว่าความชุกของการเกิดกระบังลมหย่อน ร้อยละ 24.7 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.9% มีความรู้เรื่องกระบังลมหย่อนระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์การ ถดถอยโลจิสติก พบว่าความรู้และจำนวนการตั้งครรภ์ มีระดับนัยสำคัญทางสถิติ ที่ p value < 0.05 และพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องการป้องกันโรคกระบังลมหย่อนน้อยกว่า ความรู้เรื่องปัจจัยเสี่ยง อาการแสดงของโรค ดังนั้นควรมีการสร้างความรู้ความตระหนักในเรื่องการป้องกัน ให้มากขึ้น ผลการสนทนากลุ่มพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องกระบังลมหย่อน หากแต่ไม่สามารถป้องกันโรคได้ เนื่องจากขาดความช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัว ซึ่งรวมทั้งสามี

สาขาวิชา: สาธารณสุขศาสตร์..... ลายมือชื่อนิสิต.....
ปีการศึกษา: 2553..... ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.....

5379112453 : MAJOR PUBLIC HEALTH

KEYWORDS : UTERINEPROLAPSE/MARRIEDWOMEN/ REPRODUCTIVE AGE / KNOWLEDGE/ATTITUDE/PREVENTIVE MEASURES

ASHMA BARUWAL: KNOWLEDGE, ATTITUDE, PREVENTIVE MEASURES AMONGST MARRIED WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE TOWARDS UTERINE PROLAPSE IN THE 8 VDCs OF SURKHET DISTRICT, NEPAL. ADVISOR: ASST.PROF.RATANA SOMRONGTHONG, Ph.D.104pp

The general objective of the study was to determine the prevalence of uterine prolapse in the studied sample area, knowledge, attitude and preventive measures of uterine prolapse amongst the married women of reproductive age in the 8 vdc's of Surkhet district of Nepal. It was a cross sectional study. There were a total of 267 participants in the study. Systematic random sampling was done. Data were collected by constructed questionnaire and analyzed by percentage, arithmetic mean, standard deviation, chi square and the logistic regression. The data were analyzed by using level of significance at 0.05. Focus group discussion was carried amongst women with and without prolapse to understand their preventive behavior

The results showed that the prevalence of uterine prolapse was 24.7%. Women had a moderate level of knowledge regarding uterine prolapse (51.9%). Logistic regression revealed that knowledge level (p value<0.01), attitude level (p value<0.05) and parity (p value<0.05) were significant.

The results showed that women have knowledge about the preventive measures is less as compared risk factors, signs and symptoms therefore showing that more awareness programs are needed in the area. Focus group revealed that though women had knowledge about uterine prolapse, they could not practice it due to lack of help from family members including her husband.

Field of Study : Public Health **Student's Signature :**

Academic Year : 2010 **Advisor's Signature :**