

ปีนป็นัทธ์ นาคหิรัญนค : รุบเบการตีมหนักขงกลุ่มผู้ใหญตอนตั้นในสถานบันเทงกลางคั้น  
 ย่านเศรฐฐกิจและสังคคขึ้นสูง กรุงเทพมหานคร (The pattern of binge drinking among  
 young adults in high socioeconomic nightclubs, Bangkok) อการยที่ปริกษาวิทยานพนธ์:  
 อ.ดร.จิตรดา อารียสันติชัย, 97 หน้า

วัตถุประสงค์ของการศึกษามุ่งเน้นศึกษารูปแบบการดื่มหนักในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้น ที่มีอายุ  
 ระหว่าง 20-34 ปี ในสถานบันเทงกลางคั้นในพื้นที่ย่านเศรฐฐกิจและสังคคขึ้นสูงในกรุงเทพมหานคร จาก  
 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามโดยใช้แบบคัดกรองภาวะขงผู้ที่ดื่มหนัก หรือ AUDIT คะแนนระหว่าง 8-  
 19 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 348 คนผ่านเกณฑ์คัดเลือก และพบว่าเพศชายมีคะแนนมากกว่าเพศ  
 หญิง การศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ที่ดื่มหนักส่วนใหญมีฐานะปานกลางไปจนถึงในระดับค่อนข้างดี และ  
 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้ต่อเดือนสูงกว่ามีแนวโน้มในการใช้จ่ายในการดื่มแอลกอฮอล์  
 สูงกว่า และ ดื่มหนักในปริมาณมากกว่า เมื่อพิจารณา เพศชายเสียค่าใช้จ่ายแอลกอฮอล์ และดื่มใน  
 ปริมาณที่สูงกว่าผู้หญิง ใน 30 วันที่ผ่านมาเพศชายดื่มเบียร์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68.8 ในขณะที่เพศ  
 หญิงดื่มไวน์มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 64.6 ในประเด็นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานบันเทง  
 กลางคั้นร้อยละ 94.3 และที่ตั้งร้อยละ 95.1 ส่งผลโดยตรงต่อการเที่ยวสถานบันเทง นอกจากนี้ยังพบว่า  
 เพื่อนร้อยละ 95.1 มีอิทธิพลทำให้กลุ่มตัวอย่างดื่มหนักมากขึ้น

กลุ่มตัวอย่างบางส่วนเคยประสบผลกระทบอันเนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ไม่สามารถ  
 ดำเนินชีวิตปกติได้เพราะได้ดื่มแอลกอฮอล์เมื่อคืน เกิดอุบัติเหตุ และมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกัน การ  
 ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากขึ้น มีโอกาสที่จะเกิดผลกระทบที่กล่าวมาข้างต้นสูงขึ้น การใช้สารเสพติด  
 ในเพศชายมีมากกว่าในเพศหญิง ชนิดของสารเสพติดที่พบมากในสถานบันเทงได้แก่ โคเคนร้อยละ 38.5  
 อิรีมินไฟร้อยละ 28.4 และยาอีร้อยละ 25.3 กลุ่มตัวอย่างรายงานว่าใช้สารเสพติดร่วมกับการดื่ม  
 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือใช้โคเคนร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ  
 ยาอีร้อยละ 25.9 และอิรีมินไฟร้อยละ 24.4 การศึกษาครั้งนี้พบว่าการดื่มหนักในสถานบันเทงมีจำนวน  
 สูงมาก และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้นจากฐานข้อมูลดังกล่าวควรได้รับการวางแผน ฝัาระวัง หรือ อ  
 หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขในเชิงมาตรการต่าง ๆ ต่อไป

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

ลายมือชื่อนิสิต.....

ปีการศึกษา 2553

ลายมือชื่อ อ.ที่ปริกษาวิทยานพนธ์.....

##5379105053: MOJOR PUBLIC HEALTH

KEYWORDS: YOUNG ADULTS/ NIGHTCLUBS/ BINGE DRINKING

PYNPINAT NAKHIRUNKANOK: THE PATTERN OF BINGE DRINKING AMONG YOUNG ADULTS IN HIGH SOCIOECONOMIC NIGHTCLUBS, BANGKOK. THESIS ADVISOR: CHITLADA AREESANTICHAJ, PH.D., 97 pp.

This study investigated the pattern of binge drinking among young adults in high socioeconomic area. Total 348 respondents were passed the screening test of AUDIT within 8-19 score of binge level. Males were more likely to have harmful drinking than females as males were more likely to drink more than females, as males were more likely to drink than females. People who binge drinking around high socioeconomic area has moderate to wealthy status and finished at least Bachelor degree. The respondents who earned high income were more likely to drink more volume of alcohol, and tended to spend more on their binge drinking; especially males were found to spend higher than females.

Beer (68.8%) was the type that males consumed the most in past 30 days, while wine (64.6%) was the most in females. Selling alcohol (94.3%) and location (95.1%) showed the majority that encouraged the respondents to nightclubs. Influenced by friend (95.1%) were also the major elements in development of binge drinking problems.

Many of the respondents experienced alcohol-related consequences such as unable to continue regular routine (81.9%), accidents (42.8%), and unprotected sex (42.5%). The chance created these consequences had increased by the higher volume of alcohol consumption. There was the high number of illicit drug used, as males have ever consumed more drugs comparing to females. The number of respondents who consumed Cocaine (38.5%), Erimin5 (28.4%), and Ecstasy (25.3%) were popular in nightclubs. Some of the respondents admitted that they paired drugs with alcohol, as Cocaine (33.3%) was the highest, following with Ecstasy (25.9%), and Erimin5 (24.4%) respectively. The study found that binge drinking in high socioeconomic nightclubs was considerably high, and affected to health consequences. The related organization should be surveillance, and plan for the future prevention and intervention.

Field of Study: Public Health

Student's Signature.....

Academic Year: 2010

Advisor's Signature.....