

ป็นที่ชนิด นันตติกุล: ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยนอกคลินิก
ทั่วไปวัยผู้ใหญ่ชาวไทยที่โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย.

(PREVALENCE OF AND FACTORS ASSOCIATED WITH DEPRESSION
IN THAI ADULT GENERAL OPD PATIENTS AT PHANOMPRAI
HOSPITAL, ROI-ET PROVINCE, THAILAND) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลัก: อ. ดร.ประเทือง หงสรานการ, 104 หน้า

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา ความชุกของภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยนอกคลินิกทั่วไปวัยผู้ใหญ่ โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 425 คน ซึ่งเป็นผู้ป่วยอายุ 18-59 ปี ที่มารับบริการตรวจรักษาที่คลินิกทั่วไป โรงพยาบาลพนม
ไพร ในช่วง วันที่ 3-19 มีนาคม 2553 เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป แบบวัดการสนับสนุนทาง
สังคม แบบวัดเหตุการณ์ความเครียดในชีวิต และแบบประเมินอาการซึมเศร้า สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ การทดสอบ t-test และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน

ผลการวิจัย พบว่า ความชุกของภาวะซึมเศร้า พบร้อยละ 11.5 โดยมีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับเล็กน้อย
ถึงปานกลาง ร้อยละ 8 และภาวะซึมเศร้าระดับรุนแรง ร้อยละ 3.5

สถานภาพสมรส, บุคคลที่อาศัยอยู่ด้วย และ ประวัติการเป็นโรคซึมเศร้า มีความสัมพันธ์ กับการเกิด
ภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ $p < 0.001$ รายได้ครัวเรือนต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการเกิด
ภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ $p < 0.01$ เพศ อาชีพ และโรคซึมเศร้าในครอบครัวมีความสัมพันธ์
กับการเกิดภาวะซึมเศร้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ $p < 0.05$

การสนับสนุนทางสังคม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเกิดภาวะซึมเศร้า ($r = -.647, p < 0.001$)
ส่วนเหตุการณ์ความเครียดในชีวิต พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเกิดภาวะซึมเศร้า ($r = .648, p < 0.001$)

การวินิจฉัยกลุ่มตัวอย่างที่พบว่า มีภาวะซึมเศร้าโดยละเอียด, การดูแลเป็นพิเศษในกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะ
ซึมเศร้า, การให้ความรู้ และการจัดกิจกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า เป็นแนวทางที่ น่าจะช่วยพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพนมไพรได้

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์.....ลายมือชื่อนิติ.....
ปีการศึกษา 2552.....ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.....

5279107253 : MAJOR PUBLIC HEALTH

KEYWORDS : THAI ADULT GENERAL OPD PATIENTS / PHANOMPRAI HOSPITAL / ROI-ET / THAILAND / DEPRESSION

PUNCHANIT NUNTATIKUL : PREVALENCE OF AND FACTORS ASSOCIATED WITH DEPRESSION IN THAI ADULT GENERAL OPD PATIENTS AT PHANOMPRAI HOSPITAL, ROI-ET PROVINCE, THAILAND. THESIS ADVISOR: PRATHURNG HONGSRANAGON, Ph.D., 104 pp.

The purpose of this research was studying about the prevalence of depression and factors related to the depression in general Outpatients Department of Phanomphrai Hospital. The subjects were 425 patients aged 18-59 years old, who received treatment at the hospital during 3rd-19th March 2010. The tools composed of a structured interview about general information, social support (measured by The Personal Resource Questionnaire), life stress event and depression (measured by HRSR Scale: Diagnostic Screening for Depression in Thai). The variables were determined by percentage, mean, standard deviation, Chi-square, independent t-test and Pearson Correlation.

The results of this research were as follow: the prevalence of depression was 11.5%. The severity of the depression was classified as little to moderate 8% and severe 3.5%.

Marital status, family member living with, and history of depression was statistically significant related with depression ($p < 0.001$), monthly household income was statistically significant related with depression ($p < 0.01$), gender, occupation, and depression in family was statistically significant related with depression ($p < 0.05$).

Social support was statistically significant negative correlated with depression ($r = -.647, p < 0.001$). Stress in life was statistically significant positive correlated with depression ($r = .648, p < 0.001$).

Scrupulous diagnosis for depressed subjects, special taking care of vulnerable group, education, and appropriate activities for reducing risk factors to depression are recommended to improve quality of life among Phanomphrai people.

Field of Study: Public Health Student's Signature:

Academic Year: 2009 Advisor's Signature: