

นงลักษณ์ คำสวัสดิ์ : การเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองระหว่างมารดาที่ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์และไม่ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์. (COMPARISON OF SELF-CARE BEHAVIOR BETWEEN HIV/ AIDS INFECTED AND NON-INFECTED MOTHERS) อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ดร.อุษณีย์ พึ่งปาน, 81 หน้า.

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองระหว่างมารดาที่ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์และไม่ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ ตามกรอบแนวคิดการดูแลตนเองของโอเรม 6 ด้านใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มศึกษาคือมารดาหลังคลอดที่ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ จำนวน 8 คนและกลุ่มเปรียบเทียบคือมารดาหลังคลอดที่ไม่ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์ จำนวน 8 คน มารับบริการหลังคลอดในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2554 ถึงเดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2554

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านที่ 1 อาหาร น้ำและอากาศ ทั้ง 2 กลุ่มการรับประทานอาหารครบทั้ง 5 หมู่ กลุ่มที่ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์งดอาหารหมักดองซากาแฟ กลุ่มไม่ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์งดอาหารไขมัน รสหวาน งดปลาร้า ด้านที่ 2 การขับถ่ายไม่มีปัญหาท้องผูกและการขับถ่ายปัสสาวะ มีความแตกต่างเรื่องสีอุจจาระพบว่ากลุ่มติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์อุจจาระเป็นสีดำในช่วงรับประทานยาต้านไวรัส (AZT) ด้านที่ 3 การมีกิจกรรมและการพักผ่อน ทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน ด้านที่ 4 ความสั้น โดยและการเข้าสังคม กลุ่มติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์มักหวั่นไหวมากกว่าครอบครัวขยาย สัมพันธภาพในครอบครัวกลุ่มติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์มีทะเลาะกันบ้างส่วนกลุ่มไม่ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์มีสัมพันธภาพที่ดีบุคคลที่ช่วยเหลือถูกเป็นคนในครอบครัวช่วยเหลือเหมือนกัน การร่วมกิจกรรมของชุมชน กลุ่มติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าโดยการช่วยพัฒนาชุมชน ด้านที่ 5 การป้องกันอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ กลุ่มติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์เลี้ยงลูกด้วยนมผสม กลุ่มไม่ติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกคนและให้อาหารเสริมร่วมก่อนลูกอายุครบ 6 เดือน ด้านที่ 6 การดำรงชีวิตอย่างปกติสุข กลุ่มติดเชื้อเอช ไอ วี/เอดส์กังวลใจเรื่องการติดเชื้อแต่พึงพอใจในชีวิต ทั้ง 2 กลุ่มผลตรวจหลังคลอดปกติและไม่ได้นัดตรวจหลังคลอดอีก

ทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมดูแลตนเองแตกต่างกันในด้านที่ 1,2,4,5,6
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์.....ลายมือชื่อนิสิต.....*โอบรณ์ พิรัมย์*
ปีการศึกษา 2553.....ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.....*สม ๖-1*

5279134153 : MAJOR PUBLIC HEALTH

KEYWORDS : MOTHERS / SELF- CARE / HIV/ AIDS - INFECTED

MOTHERS / THE POSTPARTUM PROCEDURCS OF MOTHERS

NONGLAK KHAMSAWARDE : COMPARISON OF SELF-CARE

BEHAVIOR BETWEEN HIV/ AIDS INFECTED AND NON-

INFECTED MOTHERS. ADVISOR : USANEYA PERNGPARN, Ph.D.,

81 pp.

The objective of the qualitative research was to study the comparison of self-care behavior between HIV/ AIDS inspected and non-infected mothers. The study was conducted by interviewing data of the 6 aspects of self-care behavior under Orem's self-care framework. The research's case study includes the eight HIV/AIDS- infected postpartum mothers versus the HIV/AIDS- non infected mothers who received the postpartum services during March- April 2011 at Roi-Et Hospital.

The research results found that the self-care behavior of aspect 1, All informants attempted to take care themselves properly by having complete five nutrients, abstaining from fermented food, tea, coffee, fat food, soda and sweet food which would make them fat, additionally, fermented fish which could cause itchy at the wound from Caesarean section was not allowed as well. In aspect 2 The findings showed that all informants didn't have any constipation and urination problems. One of the HIV-infected informants excreted 1-3 times a day; the feces turned black during the AZT (Azidothymidine) - antiviral medication. Aspect 3, activity and rest, both groups were not different. Aspect 4 Solitude and Social interaction showed that most of the infected informants were from nuclear families rather than extended families. Due to their belief that being an HIV/AIDS-infected patient was considered as their own and family's stigma, they wanted to conceal the truth about their infection. they participated in community's activities; they did such folding paper birds, doing some pieces of work for festivals and participating in their community development trainings and helping their community development in cleaning. Aspect 5 prevention of hazard, the HIV/AIDS-infected informants fed their babies with the formula milk, the non-infected informants did breastfeed their babies with breast milk even some could not continue breastfeed until six months. Aspect 6, promotion of normality, both groups were satisfied with their lives but some anxieties were found among the HIV/AIDS-infected group. Both groups were normal after follow up.

The difference between those two groups were aspect 1,2,4,5,6

Department : Public health

Field of Study : Reproductive health

Academic Year : 2010

Student's Signature Nonglak Khamsa

Advisor's Signature Usaneya Perngparn