นุชวดี วรรณคำ: การประเมินความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวในการป้องกันการคูแลเท้า ด้วยตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่สอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ประเทศไทย (ASSESSMENT OF KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PRACTICE OF PREVENTIVE SELF- CARE ON DIABETIC FOOT ULCER IN TYPE II, DIABETIC PATIENTS, MUANG ROI-ET DISTRICT,ROI-ET PROVINCE, THAILAND) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ผศ.ดร.ประเทือง หงสรานากร, 103 หน้า

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อประเมินความรู้ ทัศนคติและการ<mark>ปฏิบั</mark>ติตัวในการป้องกันก<mark>ารดูแลเท้าด้วย</mark>ตนเองของผู้ป่วยโรคเบ<mark>าห</mark>วานชนิดที่สอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ปร<mark>ะเทศไท</mark>ย เก็บข้<mark>อมูลระห</mark>ว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวากม 2552 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ ป่วยโรคเบ<mark>าหวานชนิดที่ส</mark>อ <mark>งที่ขึ้นทะเบี</mark>ยนที่คลินิกเบาหวาน โรงพยาบาล ร้อยเอ็คโดยเรียงลำดับตามรหัสเลขที่ท<mark>ะเบียนเบาหว</mark>าน ID (DM) จำนวน 300 คน ซึ่งได้มาจากการ เลือกแบบ quota sampling เครื่องมื<mark>อที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ประกอ</mark>บด้วย 4 ส่วน ค่าความเชื่อมั่นทั้ง ็ฉบับเท่ากับ 0.758 สถิติที่ใช้ในโปรแ<mark>กรม SPSS (version 17) ใ</mark>ด้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทคสอบ Chi-square test ผลการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิคที่ สอง ส่วนใหญ่เป็นหญิง (67.3%) อายุระหว่าง 55-60 ปี (ร้อยละ 41.7) (อายุเฉลี่ย 53 ปี) สมรสแล้ว (ร้อยละ 76.0) จบการศึกษาระค<mark>ับประถมศึกษา (ร้อยละ 59.0</mark>) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (30.0%)จำนวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4 คน รายได้เฉลี่ย 15.682 บาทต่อเดือน และรายจ่ายเฉลี่ย 10,702 บาท ต่<mark>อเดือน สมาชิ</mark>กในครอบครัวไม่มีประวัติป่วยเป็นโรคเบาหวาน (ร<mark>้อย</mark>ละ 45.3) และไม่ เคยมีแผลที่เท้าโคยไม่รู้สึกตัว (ร้อยละ 80.3) ผู้ป่วยโรกเบาหวานชนิคที่สองมีคะแนนความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันการเกิดแผลที่เท้าด้วยตนเองโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 66.0 (ระดับปานกลาง) ทัศนคติเห็น ด้วยต่อการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าด้วยตนเองโดย รวมคิดเป็นร้อยละ 75.3 (ระดับสูง)การปฏิบัติ ตนเพื่อการป้องกันการเกิดแผลที่เท้าด้วยตนเอง โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 50.7 (ระดับสง) และปัจจัยที่ ้มีผลต่อการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดแผลที่เท้าของผู้ป่วยโรกเบาหวานชนิดที่สองอย่างมี นัยสำคัญที่ระดับ .05 ได้แก่ เพศ (0.021) อาชีพ (0.005) ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (0.008) ความรู้ (0.000) และทัศนคติ (0.000)

สาขาวิชา	การพัฒนาระบบสาธารณสุข	ลายมือชื่อนิสิต
ปีการศึกษา_	2554	ลายมือชื่อ อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

##5179145053: MAJOR HEALTH SYSTEMS DEVELOPMENT KEYWORDS: DIABETIC PATIENTS, DIABETIC WOND, DIABETIC FOOT CLINIC, KNOWLEGDE, ATTITUDE, PRACTICE, SELF-CARE.

NUCHWADEE WANKUM: ASSESSMENT OF KNOWLEDGE,
ATTITUDE, AND PRACTICE OF PREVENTIVE SELF-CARE ON
DIABETIC FOOT ULCER IN TYPE II DIABETIC PATIENTS, MUANG
ROI-ET DISTRICT, ROI-ET PROVINCE, THAILAND.THESIS ADVISOR:
ASST. PROF. PRATHURNG HONGSRANAGON, Ph.D., 103 pp.

This research was a survey research with the objectives to assess the knowledge, attitude, and practice of preventive self-care on diabetic foot ulcer in type II diabetic patients, Muang Roi-Et District, Roi-Et Province, Thailand. Data collection was between September to December 2009. The samples were registered diabetic type II patients at Diabetes Mellitus Clinic at Roi-Et Hospital according to their registration numbers ID (DM) for a number of 300 respondents by quota sampling. The research tool was an interview form in 4 parts. The overall reliability value was 0.758. Statistics in use by SPSS version 17 were frequency, percentage, mean, standard deviation, and Chi-square test.

The result revealed that most of the respondents were female (67.3%), aged between 55-60 years old (41.7%) (Mean age 53 years). They were married (76.0%), finished primary school (59.0%), and were agricultures (30.0%). Average number of their family members was 4. Average income was 15,682 baht monthly with 10,702 baht monthly expenses. Family members did not have diabetes mellitus history (45.3%) and never had foot ulcer unconsciously (80.3%). The respondents had their knowledge level on preventive self-care part for 66.0% (moderate level), had their attitude level on preventive self-care part for 75.3% (high level) and their practice on preventive self-care part for 50.7% (high level). Factors associated with preventive self-care part at the level of 0.05 were gender (0.021), occupation (0.005), household expense (0.008), knowledge (0.000) and attitude (0.000).

Field of Study:Ho	ealth Systems Development	Student's Signature
Academic Year:	2011	Advisor's Signature