

สุดา เฉพโกตา:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่ออาการมดลูกหย่อนในกลุ่มหญิงสมรสแล้วในช่วงอายุที่สามารถมีบุตรได้ในอำเภอตั้ง ประเทศเนปาล . (FACTORS RELATED TO UTERINE PROLAPSE AMONG MARRIED WOMEN OF CHILD BEARING AGE IN DANG DISTRICT NEPAL) อ.ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ หลัก : อ.ดร.เทพนาฏ พุ่มไพบุลย์, 109 หน้า.

อาการมดลูกหย่อนเป็นหนึ่งในภาวะกะบังลมหย่อนในสตรี การทำงานหนัก การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ การคลอดบุตรเมื่ออายุน้อย ระยะห่างระหว่างครรภ์น้อยและการขาดบุคลากรที่ได้รับการฝึกในการทำคลอดอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอาการมดลูกหย่อนได้ การศึกษานี้มุ่งเน้นที่จะกำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาการมดลูกหย่อนในหญิงสมรสแล้วในช่วงอายุที่สามารถมีบุตรได้คือ อ ในช่วงอายุ 15-49 ปีในอำเภอตั้ง ประเทศเนปาล การศึกษานี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่งแบบตัดขวาง และใช้แบบสอบถามสำรวจครัวเรือนในการสัมภาษณ์หญิงสมรสแล้วที่อยู่ในวัยที่สามารถมีบุตรได้จำนวน 385 คนในหมู่บ้านที่ 1 และ 2 ของหมู่บ้านชัวดิยา อำเภอตั้ง โดยการเลือกแบบสุ่มและทำการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักโดยสัมภาษณ์เชิงคุณภาพจากนักสังคมสงเคราะห์จำนวน 6 คน

ผลการศึกษาพบว่า หญิงสมรสแล้ว ร้อยละ 97 จากกลุ่มตัวอย่าง 385 คน ไม่มีอาการมดลูกหย่อน มีเพียง 9 คนเท่านั้นที่พบอาการดังกล่าว เนื่องจากลักษณะของข้อมูลและจำนวนหญิงที่มีอาการมดลูกหย่อนนั้นพบน้อย จึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Fisher's Exact test เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม พบว่าอายุของหญิงที่อยู่ในช่วงอายุที่สามารถมีบุตรได้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการเกิดอาการมดลูกหย่อน ($p=0.021$) อย่างไรก็ตามไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างรูปแบบการดำเนินชีวิตและการเข้าถึงและการใช้บริการด้านสุขภาพกับการเกิดอาการมดลูกหย่อนในหญิงสมรสที่อยู่ในช่วงอายุที่สามารถมีบุตรได้

สาขาวิชา..... สาธารณสุขศาสตร์..... ลายมือชื่อนิติศ.....
ปีการศึกษา..... 2555..... ลายมือชื่ออ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.....

5578815053: MAJOR PUBLIC HEALTH

KEYWORDS: UTERINE PROLAPSE/CHILD BEARING MARRIED WOMEN/NEPAL.

SUDHA DEVKOTA:FACTORS RELATED TO UTERINE PROLAPSE AMONG MARRIED WOMEN OF CHILD BEARING AGE IN DANG DISTRICT, NEPAL, ADVISOR: TEPANATA PUMPAIBOOL,Ph.D., 109 pp.

Uterine Prolapse (UP) is a form of genital prolapse among females. The heavy workload, under nutrition, delivery at a young age, lack of spacing between pregnancies and absence of trained birth attendees are expected to contribute to UP. Study is focused to determine the factors related to UP among married women of child bearing age (15-49 yrs) in Dang district of Nepal. Thus, a descriptive cross sectional study design has been adopted and household survey questionnaire is introduced among randomly selected 385 married women of child bearing age of ward number 1 and 2 of Saudiyar Village Development Committee (VDC) of Dang district of Nepal. Similarly, Key Informant Interview (KII) has been done with 6 social workers to collect qualitative information.

Study had reported that out of the total 385 respondents; significant majority (97.7%) did not have uterine prolapse where as only 9 (2.3 %) of the women of child bearing age had uterine prolapse. Based in nature of data and due to small number of women suffering from UP, Fisher's Exact test has been done to test the relationship between dependent and independent variables. Significant relationship ($p=0.021$) has been observed between age of the child bearing women and occurrence of UP. However, there is not any significant relationship between the lifestyle related and access &utilization of health services factors with occurrence of uterine prolapse among the women of child bearing age.

Field of Study: Public Health _____ Student's Signature _____

Academic Year: 2012 _____ Advisor Signature _____