

อิดซาร์ต อาลี โจคิโอ: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของผู้ป่วยนอกเพศชาย โรงพยาบาลเฟดาเรล, อิสลามาบัด ปากีสถาน. (Sexually Transmitted Infection (STI) Among Urban Men Attending the Out Patient Department (OPD) of Federal Government Services Hospital (FGSH) Islamabad, Pakistan. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : อ. อเลสซันโดร ฟันซา, M.D, M.Com.H, DTMH. 100 หน้า

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางโดยทำการศึกษาในผู้ชายที่เข้ารับบริการผู้ป่วยนอกแผนกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรงพยาบาลเฟดาเรล ซึ่งได้รับการตรวจวินิจฉัยโรค จาก 1) การซักประวัติอาการ และการตรวจทางคลินิก และ 2) จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการโดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจำนวน 493 รายจากข้อมูลผู้รับบริการผู้ป่วยนอกแผนกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของโรงพยาบาลเฟดาเรล ปี 2552

จากผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยอายุของกลุ่มประชากร 27 ปี ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มประชากรอายุระหว่าง 25 – 34 ปี ร้อยละ 57 ของประชากรกลุ่มตัวอย่างมีสถานะภาพสมรส ร้อยละ 59.4 รับราชการ ร้อยละ 40 จบการศึกษาสูงกว่าระดับประถมศึกษา สองในสาม (ร้อยละ 73) มีรายได้ต่ำ ร้อยละ 64.7 นับถือศาสนาอิสลาม และมากกว่าครึ่งของประชากร (ร้อยละ 52) อาศัยอยู่ชุมชนแออัด พบว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้รับการวินิจฉัยจากอาการและอาการแสดง (ร้อยละ 60.2) ซึ่งมากกว่าการวินิจฉัยจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (ร้อยละ 39.7) จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 29 รายพบการกลับมาเป็นซ้ำของโรค (ร้อยละ 5.9)

จากจำนวนผู้ป่วยผู้ชายเขตเมืองที่เคยได้รับการวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรงพยาบาลเฟดาเรล ปี 2552 พบว่า มีการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซ้ำหลังสิ้นสุดการรักษาครั้งแรก ร้อยละ 1.2 และในจำนวนนี้ยังพบอุบัติการณ์การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่นๆ ร้อยละ 3.8 นอกจากนี้ยังพบอุบัติการณ์การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้ป่วยรายใหม่ ร้อยละ 0.8 และจากการคำนวณทางสถิติพบว่า อายุ กับการได้รับการวินิจฉัยโรคหนองในแท้ และ โรคตับอักเสบบี จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) และสถานะภาพสมรส กับการได้รับโรคหนองในแท้ และโรคแผลริมอ่อนจากการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.05$) ไม่พบว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการซักประวัติอาการ /การตรวจทางคลินิก และ จากการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์.....ลายมือชื่อนิสิต.....

ปีการศึกษา 2552.. ลายมือ อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.....

5279127853: MAJOR PUBLIC HEALTH

KEYWORDS: SEXUALLY TRANSMITTED INFECTION

IRSHAD ALI JOKHIO: SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS (STIs) AMONG URBAN MEN ATTENDING THE OUT PATIENT DEPARTMENT (OPD) OF FEDERAL GOVERNMENT SERVICES HOSPITAL (FGSH) ISLAMABAD, PAKISTAN. THESIS ADVISOR: ALESSIO PANZA, M.D., M.P.H. 99 pp.

This cross sectional study was conducted among urban men attending the STI OPD of FGSH in OPD of STI patients. Hospital record were reviewed for two types of diagnosis made by doctor one was syndromic diagnosis based on history and clinical examination and other was Laboratory diagnosis based on STI OPD record of FGSH 2009. The sample size 493 was used .The result showed the proportion of STI compared to all diagnosis in men from urban area was 12.2%. most of participants mean age was 27 years .More than half of patients were between 25-34 years age groups, 57% were married ,59.4% had government job more than 40% were educated up to primary level , near two third 73% was in low income, 64.7% had religion Islam and more than half 52% were belong from urban slum area. The overall percentage of STI by syndromic diagnosis 60.2% is more than diagnosed by laboratory 39.7% .The frequencies of follow up of patients of STI 29 (5.9%). The proportion of men in urban area with STI who come back with persistent signs and symptoms of STI after completion of first line treatment is (1.2%), and frequencies of incidence of new STI 19 (3.8%). There was significant association ($p < 0.05$) between young age and married with Gonorrhoea , young age with hepatitis B and Chancroids with married by laboratory diagnosis, in syndromic diagnosis only scrotal swelling with address maintain statistically significant.

Field of Study: Public Health

Student's Signature.....

Academic Year: 2009

Advisor's Signature.....